

Le Bassin du Diawling-Tichilitt



Le bassin est composé de deux lacs (Diawling et Tichilitt). Il couvre une superficie globale de 11 000 h

Le bassin de Bell

Il s'étend sur une superficie de 4.500 ha et se caractérise par la diversité de ses sites écologiques qu



Il se caractérise par :

- Un plan d'eau ouvert et riche en microfaune et flore (douce et saumâtre)
- Un plan d'eau relativement fermé (douce et saumâtre)
- Une zone inondée riche en graminées
- Une zone de *Nymphéa lotus*
- Une zone à graminées vivaces
- Un plan d'eau riche en nutriments

Le bassin du Gambar



Il couvre 4 500 ha. C'est une plaine inondable avec plusieurs marigots. Il est entrecoupé de canaux. Toutefois, il continue à servir de refuges aux pythons et aux crocodiles et de nid pour le râle noir, la p

Le bassin du N'Thiallakh



D'une superficie d'environ 20 000 ha, il est principalement alimenté par le sud via le marigot du même

Les Lacs N'Tok et N'Ter :

Alimentés en eau par le N'Thiallakh et l'ouvrage de Cheyal (N'Tok seulement), ils constituent des lieux

Le bassin de Gueyloubou



Il couvre une superficie estimée à 4 000 ha. Il est alimenté par le marigot du même nom, qui est situé à

